

((تأثير استخدام مستويات مختلفة من حبوب طلع النخيل في بعض صفات الدم لدى إناث الأرناب المحلية))

حسين علي حسين حبيب

لبنى فائق ياسين

محمود عبد عدوان

مهند فالح منصور

بإشراف الدكتور

علي شهاب احمد

الخلاصة:-

اجريت هذه الدراسة في جامعة ديالى – كلية الزراعة – قسم الانتاج الحيواني _ الحقل الحيواني للفترة من -2016 20-11 لغاية 20-1-2017 على الارانب المحلية وتم شراؤها من الاسواق المحلية وعددها 12 أرناب أنثى وبمعدل اعمار 1-2 سنة وأوزانها تتراوح بين 1.320-1.474 كغم. وقسمت الحيوانات بشكل عشوائي الى ثلاث مجاميع متساوية العدد بواقع اربعة ارناب في كل مجموعة، وضعت في اقفاص خشبية بابعاد 40*50*60 سم (الطول، العرض، الارتفاع) على التوالي، اي وضع كل حيوانين في قفص واحد مع تقديم العلف اليومي بشكل ثابت يوميا ومتسلسل لكافة المجاميع مع مراعاة توفير ماء الشرب. المجاميع هي: السيطرة C استخدم فيها عليقة خالية من حبوب طلع النخيل ومجموعة T1 و T2 استخدم فيها عليقة تحتوي 4 و 8 غم حبوب طلع النخيل لكل كيلو غرام علف على التوالي لنفس عليقة السيطرة . حيث بينت النتائج إلى وجود فروق معنوية ($P \leq 0.05$) عند استخدام حبوب طلع النخيل في بعض صفات الدم الكامل، بنسبة الكولسترول، و الكلوكوز وللمستويين من حبوب طلع النخيل المذكورة اعلاه.

