

تأثير النظليل في نمو و تزهير بعض أصناف  
ال Dahlia

Dahlia variabilis Willd.

رسالة مقدمة إلى  
كلية الزراعة - جامعة بغداد

جزء من متطلبات درجة الماجستير في العلم الزراعي  
البستانة

من قبل  
عمر الريبي عمر الجابر الصيفي

اجريت هذه الدراسة على نبات الداليا في تجربتين منفصلتين ، الأولى فسي وحدة البيوت البلاستيكية المحمولة لقسم البستنة في كلية الزراعة / جامعة بغداد ، خلال الموسم الريحي ١٩٨٦ والثانية في البيت الزجاجي التابع لشعبة الحدائق في الكلية ذاتها ، خلال الموسم الخريفي ١٩٨٧-١٩٨٦ .

استخدم في التجربة الأولى ثلاثة اصناف من الداليا هي "Coltness Mixed" ، "Giants Mixed" و "Unwins Dwarf Mixed" ، وقد تم تظليلها ، بخمس وسائل تظليل هي :

- ١- بدون تظليل (المقارنة)
- ٢- التظليل بالساران Saran (مشبك بلاستيكي أخضر)
- ٣- التظليل بقماش الخام الأسرم .
- ٤- التظليل بطبقنة واحدة من الجوت (الجنفاص) .
- ٥- التظليل بطبقتين من الجوت .

وقد نفذت التجربة باتباع تصميم القطاعات المشوائية الكاملة RCBD (Randomized Complete Block Design) لكل موقع تظليل على س اندرا وثمانية مكررات ، ثم أتبع التحليل التجميمي Combined Analysis وحسب التصميم المذكور .

اما بالنسبة للتجربة الثانية فقد تم مقارنة اربعة اصناف من الداليا وهي "Unwins Dwarf Mixed" و "Coltness Mixed" و "Pompon Mixed" و "GTS Mixed" وقد نفذت باستخدام تصميم (RCBD) وقد تم دراسة نسبة الانبات ، ارتفاع النبات ، عدد الازهار / نبات ، قطر الزهرة ، طول الحامل الزهرى ، عدد الجذور الدرنية / نبات ، قطر الحذ ، الدبر ، والوزن الطرى للجذور الدرنية لكلا التجربتين .

ويمكن تلخيص نتائج هذه الدراسة بما ياتي : -

## **D - التجربة الاولى :**

١- تأثير المنهج :

- ـ تفوق الصنف على الصنفين الآخرين في نسبة انبات المذور  
 بـ تفوق الصنف "Coltness" على الصنفين الآخرين معنوياً فسي

جـ - تفوق الصنف "Unwins Coltness" على الصنف "Dwarf" محتويا في صفات عدد الا زهار / نبات قطر الزهرة وطول الحامل الزهرى . اما الصنف "Giants" فانه لم يزهر طيلة فترة التجربة .

د - اعطي الصنف "Coltness" اكبر عددا من الجذور الدرنية /نبات  
الا انه لم يختلف معنوها مع الصنف "Giants" في هذه الصفة . كما كان  
قطر ووزن الجذور الدرنية للصنف "Coltness" اكبر وبشكل معنوى عما هو  
عليه في الصنفين الآخرين .

٢- تأثير التظليل

٦ - لقد ازداد ارتفاع النباتات معنواً عن استخدام الظل الكيف ( تظليل )  
النباتات بطبقتين من الجوت .

ب - ادى تظليل النباتات بقماش الخام الاسمر الى زيادة عدد الا زهار / نهارات بشكل ممفوٍ ، كما ادى تظليل النباتات بطبقتين من الجوت الى عدم تزهير جميع الاصناف . ولم تكن هناك فروقات معنوية بين مستويات التظليل على صفة قطر الا زهار ، كما ادى تظليل النباتات بطبقة واحدة من الجوت الى زيادة معنوية في طول الحال ، الزهرى .